

**Lepirudin (Refludan, CSL Behring GmbH, Marburg SRN).
Depo na RS KARIM VFN Praha 2, U nemocnice 2.**

Podklady pro informaci:

výboru České společnosti pro trombózu a hemostázu ČLS JEP,
výboru České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP,
výboru České společnosti intenzivní medicíny ČLS JEP,

Na Resuscitační stanici Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice 1. LF UK Praha 2, U nemocnice 2, je uloženo depo lepirudinu (Refludanu) pro oblasti České republiky bližší Praze než Brnu (v Brně je uloženo další depo u prof. Penky).

Indikace podání: Antikoagulační léčba u dospělých pacientů s heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT) typu II a tromboembolickou chorobou vyžadující parenterální antitrombotickou terapii.

Množství uloženého lepirudinu (Refludanu): 3 balení - 10 amp. po 50 mg.

Telefonický kontakt na RS KARIM: 224 963 355, 224 917 793.

Adresa: KARIM VFN a 1. LF UK Praha, U nemocnice 2, Praha 2.

Refludan vydá staniční nebo starší sestra po dohodě s lékařem proti potvrzené žádance odebírajícího zdravotnického zařízení.

Případné konzultace k diagnostice HIT a indikaci jsou možné v Trombotickém centru VFN 1. LF UK Praha, prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc. a Centrální hematologické laboratoři UKBLD VFN 1. LF UK Praha, tel. 224 962 832, 224 962 833, 224 962 878.

Dr. J. Valenta
za KARIM VFN
a výbor ČSTH ČLS JEP

28.1.2010